

EFEITOS ADVERSOS COM USO DE MINOXIDIL ORAL NO TRATAMENTO DE LIQUEN PLANO PILAR

Introdução: Minoxidil é uma medicação antihipertensiva, e também tem sido utilizado na dermatologia para o tratamento de alopecias, principalmente pelos seus efeitos colaterais comuns de vasodilatação e hipertricose. Porém também apresenta efeitos adversos pulmonares e cardiológicos como taquicardia. O artigo relata um caso de taquicardia ao uso de Minoxidil oral no tratamento de Líquen Plano Pilar.

Objetivo: Descrever um relato de caso de paciente com diagnóstico de Alopecia Cicatricial, apresentando efeito adverso ao tratamento oral com Minoxidil.

Metodologia: Foi levantado informações no prontuário da paciente em seguimento no ambulatório de tricologia do Instituto Brasileiro de Ensino (ISBRAE), juntamente com levantamento bibliográfico sobre os efeitos adversos do uso de Minoxidil oral na dermatologia.

Resultados: Paciente apresentou taquicardia aos mínimos esforços ao utilizar Minoxidil na dose de 1mg/dia. Solicitado exames cardiológicos e redução da dose para 0,75mg/dia. Aguardando retorno para seguimento da paciente.

Conclusão: A descrição dos efeitos adversos ao uso de Minoxidil oral são bem descritos, trazendo benefícios no tratamento de Alopecias pelo seu efeito de hipertricose e vasodilatação. Porém efeitos pulmonares e cardiológicos mesmo que não muito comuns, são muitas vezes encontrados. Devendo assim realizar ajuste terapêutico para um resultado favorável, uma vez que são efeitos dose-dependente.

Palavras-chave: Minoxidil; Alopecia; Líquen Plano Pilar; Taquicardia.